

Le chamois

Alpine chamois

Gämse

(*Rupicapra rupicapra*, Linnaeus 1758)



Répartition :

7 sous-espèces réparties dans les Alpes, le Caucase, les Carpates dont les Tatras, les Balkans, l'Asie mineure, et la Nouvelle-Zélande. 3 sous-espèces d'Isard (*Rupicapra pyrenaïca*) dans les Cantabriques, Pyrénées, et Abruzzes.

Classe : mammifères

Ordre : artiodactyles

Famille : bovidés

Sous famille : caprinés

Statut juridique : IUCN-Lower Risk. Espèce de gibier soumise à la réglementation du plan de chasse.



Durée de vie :

15 à 25 ans.



Poids :

Mâle ou bouc 35 à 50 kg - Femelle ou chèvre 25 à 38 kg. La distinction entre les deux sexes n'est guère possible avant l'âge de 2 ans. Le mâle est plus grand et costaud avec un cou épais, une tête massive et des cornes plus recourbées et fermées, un pinceau pénien et une crinière sur le dos.



Taille :

75 à 80 cm de hauteur au garrot ; longueur 110 à 135 cm.



Pelage :

Gris beige - gris jaunâtre en été, il fonce en hiver et offre des contrastes plus marqués. Il est constitué des poils de duvet et de jarres. Long en hiver, la mue de printemps où le pelage tombe par touffes permet la repousse d'un poil adapté à l'été. Il porte une raie de mulet foncée sur la colonne vertébrale.



Aspect

Avec ses deux cornes en forme de crochets, le chamois ne peut se confondre avec aucun autre animal de nos montagnes. Il est bien campé sur lui-même, d'un aspect équilibré et robuste. Contrairement au bouquetin des Alpes, il se déplace très facilement en milieu neigeux grâce à ses espaces interdigitaux palmés.



Régime alimentaire :

À la belle saison des plantes herbacées, surtout graminées et légumineuses. En hiver, myrtilles, aïrelles, raisin d'ours et genévrier. Une fois la couche de neige trop importante, il se rabat sur les arbres et arbustes.



Organisation sociale :

Animal grégaire, il vit en harde, société ouverte et matriarcale. En dehors des périodes de reproduction, mâles et femelles vivent séparés. Les chèvres sont sédentaires avec les chevreaux (éterlous ou éterles), les jeunes mâles et les boucs sont nomades.



Reproduction :

La période du rut se situe vers la mi-octobre jusqu'à la fin décembre. La chèvre met bas un chevreau au terme de 160-170 jours. Les naissances ont lieu en général entre le 15 mai et le 15 juin.

7 subspecies are spread through the Alps, Caucasia, the Carpathians, the Tatras mountains, the Balkans, Asia Minor and New Zealand. There are also 3 subspecies of Isard (*Rupicapra pyrenaïca*) in the Cantabrians, the Pyrenees and the Abruzzi.

7 Unterarten in den Alpen, im Kaukasus, in den Karpaten, in der Hohen Tatra, im Balkan, in Vorderasien und in Neuseeland. 3 Unterarten der Pyrenäen-Gämse (*Rupicapra pyrenaïca*) im kantabrischen Gebirge, in den Pyrenäen und in den Abbruzzen.