

Le daim

Fallow deer
Damhirsch
(*Dama dama*, Linnaeus 1758)



Répartition :

L'homme a considérablement modifié la répartition géographique du daim, soit en exterminant l'espèce, soit en l'introduisant dans de nouvelles régions. On le trouvait à l'origine dans les régions méditerranéennes de l'Europe jusqu'en l'Asie mineure. Il aime les milieux forestiers peu denses à proximité de zones ouvertes.

Classe : mammifères

Ordre : artiodactyles

Famille : cervidés

Sous famille : cervinés

Statut juridique : Espèce gibier soumise à plan de chasse obligatoire.



Durée de vie :

16 à 25 ans.



Poids :

mâle ou daim 55 à 100 kg - Femelle ou daine 35 à 60 kg.



Taille :

70 à 100 cm de hauteur au garrot ; longueur 140 à 160 cm.



Pelage :

En été le pelage est brun-roux avec de nombreuses taches blanches. En hiver la robe s'assombrit et brunit, les taches s'estompent.



Aspect

Seul le mâle porte des bois, sa ramure en forme de palettes larges est échancrée. Sa tête dotée d'un fin museau est portée par un long cou. Le daim porte une queue noire de 15 à 20 cm. On ne peut pas le confondre physiquement ni avec le chevreuil, ni avec le cerf avec lequel il partage de nombreux comportements... Il est rapide, se déplace en faisant des bonds, et se montre un très bon nageur.



Régime alimentaire :

Bourgeons, graines, fruits, plantes céréalières, arbrisseaux comme la bruyère, écorce des arbres.



Organisation sociale :

Comme le cerf, les daims vivent en hardes séparées en dehors de la période du rut qui a lieu en octobre-novembre. Ils se livrent alors à des combats pour posséder un groupe de daines et matérialisent un territoire avec la sécrétion de ses diverses glandes odorantes et son urine. Il ne brame pas, son cri est constitué de sons rauques et se nomme le raire.



Reproduction :

La gestation de la daine est de 8 mois. Un faon naît, rarement deux, entre juin et début juillet. La daine repoussera si c'est un mâle le petit de l'année précédente, si c'est une femelle elle l'autorisera à la suiter et à rester dans la harde. Le faon naît avec des taches blanches sur le corps et les conservera toute sa vie.

Man has considerably modified the geographical distribution of the fallow deer, either by exterminating the species or by introducing it into new regions. Originally it was found in the Mediterranean regions of Europe as far as Asia Minor. It favours not too dense forest habitats with open areas nearby.

Der Mensch hat das geografische Verbreitungsgebiet des Damhirschen stark verändert, indem er die Art entweder ausgelöscht oder in neuen Gebieten eingeführt hat. Er lebte ursprünglich im europäischen Mittelmeerraum bis Vorderasien. Er bevorzugt lichte Waldgebiete in der Nähe großer Wiesen.