

Le mouflon corse



Corsican mouflon sheep
Korsische Mufflon
(*Ovis aries musimon*, Linnaeus 1758)



Répartition :

Le mouflon corse est un descendant de mouflons importés d'Asie mineure au VI^e siècle sur les îles méditerranéennes. On le trouve maintenant dans plusieurs massifs montagneux français et d'Europe centrale.

Classe : mammifères

Ordre : artiodactyles

Famille : bovidés

Sous-famille : caprinés

Statut juridique : espèce gibier soumise au plan de chasse



Durée de vie :

10 à 15 ans.



Poids :

Mâle ou bélier 35-50 kg - Femelle ou brebis 25-35 kg.



Taille :

65-75 cm de hauteur au garrot ; longueur 120 cm.



Pelage :

Son pelage présente un jabot foncé sur le poitrail, parfois une selle blanche dorsale et sur les flancs. Il est de couleur rousse à café au lait, sauf sur l'abdomen, la queue, les pattes et la face qui sont blancs. Les femelles sont plus claires que les mâles.



Aspect

Le Mouflon de Corse est de taille moyenne, au corps robuste et au poitrail large. Le front et le museau sont bombés. Très reconnaissable, le mâle porte de grandes cornes striées, à section triangulaire et terminées en pointe. Elles sont rapprochées à leur base mais se séparent en s'arquant vers l'arrière, formant un demi-cercle.



Régime alimentaire :

Il est réputé pour son éclectisme alimentaire car il consomme plusieurs centaines d'espèces végétales. Ce sont cependant les graminées qui forment la base de son alimentation.



Organisation sociale :

Le mouflon est un animal vif et très farouche. Il est diurne et actif toute l'année. C'est un animal peu endurant à la course mais doté d'une remarquable habilité à grimper dans les rochers. Le groupe matriarcal constitué des brebis, agneaux et jeunes de l'année précédente devient mixte au moment des amours. En fonction des saisons et de l'abondance de nourriture, les groupes seront plus ou moins importants.



Reproduction :

Le rut intervient entre octobre et novembre, les troupes mixtes se recomposent et les béliers en pleine force de l'âge combattent pour gagner les femelles et expulsent du groupe la concurrence. Les jeunes mâles, pendant ce temps, s'affrontent dans des joutes amicales et attendent l'opportunité de s'accoupler avec une égarée. Une brebis donne en général un agneau par an qui naîtra au printemps au bout d'une gestation de 5 mois. Les naissances sont généralement groupées de mi-avril à mi-mai.

The Corsican mouflon sheep is a descendant of mouflon sheep imported from Asia Minor onto the Mediterranean islands in the 6th century. It is now found in several mountain ranges in France and Central Europe.

Der korsische Mufflon stammt von Mufflons ab, die im 6. Jahrhundert aus Vorderasien auf den Mittelmeerinseln eingeführt wurden. Gegenwärtig sind sie in den meisten Gebirgsmassiven