

# Le yak

Yak

Yak

(*Bos grunniens grunniens*, Linnaeus 1766)



## Répartition :

Cette variété domestique du yak issue de croisements avec des vaches est utilisée comme animal de bât et comme monture. On trouve cet hybride appelé "Dzo" dans l'Himalaya, au Tibet et Népal, et sur les contreforts de Mongolie, Kazakhstan, Kirgizstan et Tadjikistan. L'espèce sauvage (*Bos grunniens mutus*) en voie de disparition compte aujourd'hui moins de 10 000 individus qui vivent entre 3 200 et plus de 6 000 m d'altitude.

**Classe :** mammifères

**Ordre :** artiodactyles

**Famille :** bovidés

**Sous famille :** bovinés

**Statut juridique :** espèce domestique élevée pour sa laine, son lait et sa viande. Animal de bât.



## Durée de vie :

20 à 25 ans.



## Poids :

Mâle, taureau ou "dzo" 600 à 750 kg - Femelle, vache ou "Dzum, dri ou nak" 300 à 400 kg.



## Taille :

130 à 170 cm hauteur au garrot Longueur environ 3 m. Le yak sauvage pouvant atteindre 200 cm au garrot pour un poids d'une tonne.



## Pelage :

Contrairement au yak sauvage toujours noir uni, le yak domestique peut être tacheté, blanc, marron, noir, ou gris. Le poils de jarre est long en particulier sous le ventre et sur la queue. Sur le dos et les flancs, sa toison soyeuse le protège des grands froids. L'intérieur des cuisses porte un poil très court.



## Aspect

Le yak est un animal massif, il donne l'impression d'avoir des pattes courtes à cause de la longueur de son dos et de ses longs poils. Femelle et mâle portent des cornes recourbées plus développées chez ce dernier. Il galope la queue levée et s'essouffle rapidement. Ses charges sont brèves mais très vives comme celles du bœuf musqué.

La distinction entre les deux sexes est facile grâce au dimorphisme sexuel. Le taureau est plus grand, beaucoup plus gros et ses cornes sont beaucoup plus développées que celles de la vache.



## Régime alimentaire :

Le yak est un ruminant brouteur. Il se nourrit de végétaux trouvés dans la toundra et les prairies d'altitude, plantes herbacées, graminées et légumineuses. En hiver il trouve des végétaux secs dans les pierriers, des buissons émergeant du manteau neigeux. Sa langue râpeuse lui permet d'arracher les lichens des rochers.



## Organisation sociale :

Animal grégaire, une harde est composée exclusivement de femelles et des jeunes, à proximité de petits groupes de célibataires mâles. Les vieux mâles choisissent la solitude. Une harde peut atteindre une cinquantaine d'individus.



## Reproduction :

la période du rut se situe en septembre. Au printemps, la Dzum met bas un veau au bout d'une gestation de 9 mois.

This domesticated variety of yak, created by cross-breeding with cows, is used as beast of burden and mount alike. We find this hybrid, called Dzo, in the Himalayas in Tibet and Nepal and in the foothills of Mongolia, Kazakhstan, Kirgizstan and Tadjikistan. The endangered wild species (*Bos grunniens mutus*) today numbers fewer than 10,000 individuals who live between 3,200 and more than 6,000 m above sea level.

Diese domestizierte Art des Yak ist aus einer Kreuzung mit Rindern entstanden und wird als Pack- und Reittier verwendet. Die als "Dzo" bezeichneten Hybriden sind im Himalaja, in Tibet und Nepal sowie in der Mongolei, in Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan verbreitet. Von der bedrohten Wildart (*Bos grunniens mutus*) existieren heute weniger als 10.000 Tiere, die auf Höhen zwischen 3.200 und mehr als 6.000 Metern leben.