

Le cerf élaphe

Red deer
Rothirsch
(*Cervus elaphus*, Linnaeus 1758)



Répartition :

Le cerf élaphe est présent dans la quasi-totalité des pays d'Europe occidentale, au sud des pays scandinaves, en Turquie et en Russie. Il est cependant absent de Grèce et très peu représenté dans les Balkans.

Classe : mammifères

Ordre : artiodactyles

Famille : cervidés

Sous famille : cervinés

Statut juridique : Espèce gibier soumise au plan de chasse obligatoire.



Durée de vie :

12 à 15 ans.



Poids :

Mâle ou cerf 160-230 kg - Femelle ou biche 90-130 kg.



Taille :

120 à 140 cm de hauteur au garrot ; longueur 160 à 260 cm.



Pelage :

Il est ras et de couleur brun fauve en été et devient plus long et brun grisâtre en hiver.



Aspect

Animal élancé, le cerf est beaucoup plus gros que la biche. Il est le seul à porter des bois qu'il perdra au tout début du printemps. C'est le plus grand de nos ongulés.



Régime alimentaire :

À la belle saison, il est essentiellement composé de plantes herbacées dont une majorité de graminées. La repousse des bois chez les cerf et la lactation des biches augmentent les besoins alimentaires et oblige le "roi" des forêts à consommer des feuillages et à faire quelques incursions dans les plantations céréalières et fourragères. En hiver l'alimentation se limite à l'abrouissement d'arbrisseaux et de végétaux trouvés sous la neige.



Organisation sociale :

Les mâles et les femelles adultes vivent en hardes séparées. Les hardes, harpails ou matriclans sont composées des biches, faons de l'année, bichettes et quelques fois de daguets qui suivent leur mère n'ayant pas eu de faon dans l'année. Ces hardes vivent sous un régime matriarcal mené par une biche âgée. Les mâles forment des hardes de boisés jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans où ils préféreront la solitude et deviendront territoriaux.



Reproduction :

Les mâles retrouvent la harde des biches au moment du rut appelé brame chez le cerf élaphe. Les amours durent de septembre à la mi-octobre et occasionnent de nombreux combats chez les mâles pour le gain des harpails. La biche met bas un faon tacheté de blanc au terme d'une gestation de 240 jours environ, appelé hère pour le mâle à l'apparition des pivots entre 6 et 8 mois. Ils deviendront bichette et daguet dans leur 2^e année. Le daguet sera cerf dès l'apparition des andouillers.

The red deer is present in virtually all the countries of Western Europe, in Southern Scandinavia, Turkey and Russia. However, there are no red deer in Greece and very few in the Balkans.

Der Rothirsch ist in fast allen westeuropäischen Ländern, im Süden Skandinaviens, in der Türkei und in Russland verbreitet. In Griechenland kommt er jedoch so gut wie nie und in den Balkangebieten nur sehr selten vor.