

# Le renne

Reindeer

Ren

(*Rangifer tarandus*, Linnaeus 1758)



## Répartition :

Il existe 9 sous-espèces réparties dans les régions circumpolaires de l'hémisphère nord. La moitié sont semi domestiques : 20 % en Fénno-Scandinavie - 75 % en Russie - 5 % en Amérique, Groenland et îles arctiques.

**Classe :** mammifères

**Ordre :** artiodactyles

**Famille :** cervidés

**Sous famille :** capréolinés

**Statut juridique :** Le renne domestique est élevé pour sa viande.



## Durée de vie :

12 à 15 ans.



## Poids :

Mâle 85 à 150 kg - Femelle ou biche ou rennette 65 à 90 kg.



## Taille :

100 à 125 cm de hauteur au garrot ; longueur 137 à 210 cm.



## Pelage :

Les teintes de la robe du renne vont du blanc au noir en passant par le fauve et le chocolat foncé. Sa toison hivernale tombe complètement lors de la mue en mai laissant apparaître par endroits la peau nue. Le poil d'été est court et foncé, il s'étoffera et s'éclaircira en hiver. La bourre serrée peut atteindre 7 cm et le poil de jarre plus long de 2 cm offre une structure canalaire qui emmagasine de l'air lui offrant un isolant supplémentaire. Les mâles ont une longue barbe sous le cou appelée "fanon".



## Aspect

Mâles et femelles portent des bois, cas unique chez les cervidés. Le faon sera dague dès 3 mois. Le renne est robuste avec de gros pieds. Il se pose à volonté sur ses onglons arrières, lui rendant l'accès aisé aux zones humides et facilite ses déplacements hivernaux. Il a le museau garni de poils et ses narines peuvent se fermer pour affronter les tempêtes de l'hiver arctique.



## Régime alimentaire :

250 plantes entrent dans son régime, les lichens étant les plus consommés en hiver avec les graminées et légumineuses, arbres, arbustes et buissons, champignons et autres herbacées. À la belle saison il mangera également des feuillages, champignons, algues et baies.



## Organisation sociale :

Il vit en hardes pouvant atteindre chez le renne de toundra plusieurs centaines d'individus. Mâles et femelles ne se quittent pas de l'année. Seul le caribou ou renne forestier effectue une migration, les hardes se rassemblant pour le grand voyage. Ce sont les femelles qui provoquent et mènent les déplacements.



## Reproduction :

la période du rut se situe vers la mi-septembre et peut s'étendre jusqu'à la fin décembre. Les mâles se battent pour se constituer des harpails pouvant contenir une cinquantaine de femelles. La biche ou rennette met bas un faon unique au terme de 216 jours de gestation. Les naissances ont lieu en général de la fin avril à la mi-juin.

There are nine sub-species spread across the circumpolar regions of the northern hemisphere. Half are semi-domesticated: 20% in Fennoscandinavia - 75% in Russia - 5% in America, Greenland and the Arctic islands.

Es gibt 9 Unterarten, die in den Regionen des Polarkreises der nördlichen Hemisphäre leben. Die Hälfte dieser Arten sind halb-domestiziert: 20 % in Fennoskandinavien - 75 % in Russland - 5 % in Amerika, Grönland und auf den Inseln des arktischen Ozeans.